居ナイ様デアルカラー寸報告スル。引用標本ノ内四川産ハ寺院ノ栽培品デアルガ貴州産ハ 栽培品カ自生品カ不明デアル。


Coix Lachryma-Jobi L. var. maxima Makino in Bot. Mag. Tokyo, XX, p. 10 (1906); Honda, Monogr. Poa. p. 416 (1930).

Hab. Prov. Szenchuan—Mt. Omei. cult. (H. Y. Ho, Sept. 29, 1935, no. 9982); Prov. Kweichow—Tuhshan, border of Kwangsi (Y. Tsiang, Aug. 20, 1930, no. 6491). (H. Migo)

## 

きうりノ畸形品トシテ第1圖ノ如キモノヲ筆者ハ先年觀察略寫シテ置イタ。果實上ニ葉

ヲ持ツモノハ既ニ知ラレテキルモノデアルガ、 之ハ少シの畸形ノ度ヲ深メテキルノデ弦ニ報告 スル次第デアル。即チ二果接着、一葉附着ノモ ノデアル。 第 2 圖ニ示スモノハきうりノ色鬚 上ニ雄花ヲ持ツタモノデアル。斯様ナモノガ數 株アラハレ、アルモノハ色鬚ガ分岐シテ其ノー 方ニ雄花ヲ持ツタ何レモ卷鬚ノ基部カラ 10 cm 内外離レタ位置ニ雄花ヲ持チ、卷鬚ノ基部又ハ 先端部ニ葡ヲ持テルモノハ無カツタ。



第 1 圖 きうりノ畸形品(×1/3) (1935 年 6 月 28 日大田寫生)



雌花ヲ持ツタモノハ未ダ觀察シナイが雌花ナレバ一層面白イト思フ。

## 〇岩政定治氏ノ種子ケ島ノ採集品(津山 尚)

1937 年 4 月 = 廣島文理科大學デ蘚苔類ヲ專心研究中ノ岩政氏ハ堀川博士 = 隨ツテ種子ケ島ヲ採集シタ。採集ノ主目的ハ蘚苔 = アツタガ、同氏ハ顯花植物モ採集シタ。ソノ中ニアツタ注意スベキモノ2種ヲ紹介スル。

1. Clematis crassifolia Bentham, Fl. Honkong. p. 7 (1861) やまはんしゃうづる 同島ノ古田官有林デ採ツタモノ。三小葉ハ非常=厚ク、鈍頭デ香港ノ植物=ヨル Bentham ノ原記載=ヨク一致スル。情イ事=花ガナイケレドモ、コーノ種デアル事=間違ハナイト思